



โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น "แนวทางการพัฒนา
พรุจิมพลีเป็นแหล่งน้ำสำรอง
เพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำ
เพื่อการเกษตร ต. เข่งแส อ. กระแสสินธุ์ สงขลา"
(פרפרנבן תוכלכיתסלול וסכככ, 2567)



BIRD GUIDE

คู่มือดูนกป่าพรุจิมพลี
ต.เข่งแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

คำนำ

“โครงการแนวทางการพัฒนาพุดิมพลีเป็นแหล่งน้ำสำรองเพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ต. เชียงแสน อ. กระเสสันธุ์ จ.สงขลา” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทุนวิจัยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนท้องถิ่น (CBR) ปี พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบแนวทางการพัฒนาพุดิมพลีเป็นแหล่งสำรองน้ำสำหรับการเกษตร รวมถึงระบบระบายน้ำและการจัดการ ดำเนินการโดยคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับคณะนักวิจัยชุมชน ต. เชียงแสน

กิจกรรมการสำรวจนกในป่าพุดิมพลีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาสภาพธรรมชาติของป่าพรุ ดำเนินการโดย ดร. นุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง และคณะ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับคณะนักวิจัยชุมชน ต. เชียงแสน ระหว่างเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ทางโครงการจึงได้จัดทำหนังสือ “BIRD GUIDE คู่มือดูนกป่าพุดิมพลี ต.เชียงแสน อ.กระเสสันธุ์ จ.สงขลา” ฉบับนี้ขึ้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อนกที่พบบริเวณพุดิมพลี ตำบลเชียงแสน อำเภอกระเสสันธุ์ จังหวัดสงขลา ระหว่างเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เพื่อใช้เป็นคู่มือศึกษานกในป่าพุดิมพลี สำหรับหน่วยงาน ชุมชน และเยาวชนในพื้นที่ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป

ดร. พิรพัฒน์ ไทศลศักดิ์สกุล
หัวหน้าโครงการ



หนังสือ: **BIRD GUIDE** คู่มือดูนกป่าพรุฉิมพลี ต. เข่งแส อ. กระแสสินธุ์ จ. สงขลา

เอกสารนี้เป็นผลผลิตจาก: “โครงการแนวทางการพัฒนาพรุฉิมพลีเป็นแหล่งน้ำ
สำรองเพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ต. เข่งแส อ. กระแส
สินธุ์ สงขลา” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) กุณวิจัยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนท้องถิ่น
(CBR) ปี พ.ศ. 2566

คณะนักวิจัย: พิรพัฒน์ โกศลศักดิ์สกุล
คณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทวิทย์ ทะสิทธิ์ทอง และคณะนักวิจัยชุมชน ต. เข่งแส
เบญจวรรณ ธีระกุล

สำรวจจนโดย: บุชรินทร์ เพชรเกลี้ยง และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ภาพประกอบ: บุชรินทร์ เพชรเกลี้ยง
อารียา หมุดกะเหล็ม
นิกร สุวรรณการณ
คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลงกุล: นกเมืองไทย

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาและวิจัยเท่านั้น



บัญชีรายชื่อนกที่พบบริเวณพรุฉิมพลี ต.เชิงแส อ.กระเส็นรุ้ง จ.สงขลา (สิงหาคม-พฤศจิกายน 2566)

ชนิดนก	หน้า	ชนิดนก	หน้า
นกกระจาบธรรมดา	63	นกกินปลือกเหลือง	61
นกกระจับธรรมดา	53	นกงม้นท้ายทอยดำ	44
นกกระจับหน้าท้องเหลือง	51	นกงม้นน้อยธรรมดา	43
นกกระจับหน้าสีเรียบ	52	นกเขาเปล้าธรรมดา	26
นกกระจับหัวแดง	54	นกเขาชวา	29
นกกระจ้อยป่าโกงกาง	50	นกเขาใหญ่	28
นกกระตีดสีอิฐ	64	นกเขาไฟ	30
นกกระแตแต้แวด	22	นกจับแมลงสีน้ำตาล	48
นกกระปูดใหญ่	32	นกจากคาหัวเขี้ยว	49
นกกระสาแดง	4	นกเด้าดิน	41
นกกระสานวล	3	นกเด้าดินทุ่ง	42
นกกวัก	19	นกตะวาบทุ่ง	36
นกกระแต้นอกจาว	35	นกตีนเทียน	24
นกกาเหว่า	31	นกนางนวลเกลบบ้ายทอยดำ	25
นกทางเขนบ้าน	55	นกนางแอ่นบ้าน	39
นกกาบน้ำเล็ก	2	นกนางแอ่นแปซิฟิก	40
นกกินปลือกสีน้ำตาล	60	นกบั้งรอกใหญ่	33

บัญชีรายชื่อนกที่พบบนบริเวณพรุฉิมพลี ต.เชิงแส อ.กระเสสินธุ์ จ.สงขลา (สิงหาคม-พฤศจิกายน 2566)

ชนิดนก	หน้า	ชนิดนก	หน้า
นกปรอดสวน	46	นกยางไฟหัวดำ	11
นกปรอดหน้านวล	45	นกสีชมพูสวน	62
นกปากห่าง	13	เหยี่ยวแดง	16
นกเป็ดแดง	15	เหยี่ยวทุ่ง	17
นกเป็ดผีเล็ก	1	นกอัญชันคิ้วขาว	18
เป็ดหงส์	14	นกอีเสือสีน้ำตาล	57
นกเป่ล้าคอสีม่วง	27	นกอีแรดแถบออกดำ	56
นกพริก	23	นกอีโก้ง	21
นกโพระดกธรรมดา	34	นกอีล้ำ	20
นกยางกรอกพันธุ์จีน	5	นกเอี้ยงควาย	59
นกยางควาย	6	นกเอี้ยงสาริกา	58
นกยางโทนน้อย	8	นกแอ่นกินรัง	38
นกยางโทนใหญ่	7	นกแอ่นตาล	37
นกยางเปี่ย	9	นกแอ่นทุ่งใหญ่	12
นกยางโพระธรรมดา	10	อีกา	47



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเกลี้ยง

นกเป็ดผีเล็ก

LITTLE GREBE

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)

นกประจำถิ่นขนาดเล็ก 

- ลักษณะ**
- มีลักษณะและสีเหมือนกันทั้งสองเพศ
 - รูปร่างทั่วไปคล้ายเป็ด แต่มีขนาดเล็กกว่า
 - ปากเล็กและแหลม
 - ปีกสั้นและกลม หางสั้นมาก จนตามลำตัวละเอียดอ่อน
 - ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลแกมเทา ลำตัวด้านล่างสีขาวกว่าและค่อนข้างออกทางสีทาวมปากสีเหลือง

อาศัยและหากินตามแหล่งน้ำจืดหรือน้ำกร่อย
อาหารได้แก่ แมลง ปลาขนาดเล็ก บางครั้งกินพืช
และสาหร่ายเป็นอาหาร



ที่มา: จารุจินต์ นกตะกั่ว และคณะ (2561)



นกกาน้ำเล็ก

LITTLE CORMORANT

Phalacrocorax niger (Vieillot, 1874)

นกประจำถิ่นขนาดกลาง



ที่มา: จารุจินต์ นกตะกัญ และคณะ (2561)

ลักษณะ

- ทั้งสองเพศมีลักษณะและสีเหมือนกัน
- ปากสีดำ มีถุงใต้คางสีเทา คอยาวปานกลาง
- ปลายปีกมน หางยาวปานกลาง ปลายหางมน
- ทั่วท้องขาว
- ขนปกคลุมร่างกายสีดำ ขนปกคลุมปีกสีเทาเข้มถึงดำ
- ช่วงฤดูผสมพันธุ์ถุงใต้คางสีน้ำตาลเข้ม มีขนขาวขึ้นแซมบริเวณลำตัวด้านบนและหัวด้านบน



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเกลี้ยง

กินปลาเป็นอาหาร หาดอาหารโดยว่ายน้ำ
หรือดำน้ำ จับปลาด้วยปากขึ้นมากิน
เหนือน้ำโดยกลืนเข้าไปทั้งตัว
เมื่ออิ่มมันจะขึ้นมาเกาะบนตอ หรือ กิ่งไม้
ตามชายน้ำ ผึ่งแดดและไขรัง





ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเกลี้ยง

นกกระสาขาว

GREY HERON

Ardea cinerea Linnaeus, 1758

นกประจำถิ่นและ
นกอพยพขนาดใหญ่

- ลักษณะ**
- ทั้งสองเพศมีลักษณะสีเหมือนกัน
 - ปากตรงยาว ปลายปากแหลม หัวค่อนข้างเล็ก คอยาวมาก
 - ปีกยาว หางค่อนข้างสั้น ปลายปีกมน พายาวมาก
 - นิ้วค่อนข้างยาว โดยมีหัวและคอสีออกขาว
 - มีขนยาวสีดำคาดจากบริเวณหัวตาไปยังท้ายทอยและงอกยาวออกไปคล้ายหางเป็ดสองเส้น
 - ขนปลายปีกสีดำ ขนคลุมบนปีกและลำตัวด้านบนสีเทา ลำตัวด้านล่างสีขาว

กินสัตว์น้ำโดยยืนจ้องบนพืชลอยน้ำ
เมื่อพบเหยื่อจะใช้ปากจิกและกลืนกิน



ที่มา: จารุจินต์ นกตะกั่ว และคณะ (2561)



นกกระสาแดง

PURPLE HERON

Ardea purpurea Linnaeus, 1766

นกประจำถิ่นและ
นกอพยพขนาดใหญ่



ที่มา: จารุจินต์ นกที่รัก และคณะ (2561)

- ลักษณะ**
- ปากเรียวยาว ปลายปากแหลม หัวค่อนข้างเล็ก คอยาวมาก
 - ปีกยาว ปลายปีกมน หายาวมาก
 - หางสั้นทั้งสองเพศมีลักษณะและสีเหมือนกัน
 - กระหม่อมและท้ายทอยสีดำ มีขนสีดำตั้งแต่กระหม่อมไปถึงท้ายทอยและงอกยาวออกไปเป็นหางเปี้ยวสองเส้น
 - คอสีน้ำตาลแดง คอด้านข้างมีลายจุดสีสีดำ
 - ลำตัวด้านบนและปีกสีเทาเข้ม มีขนยาวสีน้ำตาลแดงแซมทั่วไป
 - อกสีน้ำตาลแดง



ภาพโดย อารีญา หุตตะเหล็ก

อาหารที่กินจะเป็น ปลา กุ้ง ปู กบ และเขียด





ฤดูผสมพันธุ์

ที่มา: จารุจินต์ นกที่ตะกัญ และคณะ (2561)

นกยางกรอกพันธุ์จีน

CHINESE POND-HERON

Ardeola bacchus (Bonaparte, 1855)

**นกประจำถิ่นและ
นกอพยพขนาดกลาง**

- ลักษณะ** • ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ ลักษณะลำตัวเพรียวยาวเหมือนนกยางทั่วไป
- บริเวณหัวและคอเป็นสีน้ำตาลแก่ คอยาวปานกลาง
 - หลังสีดำแกมเทา อกสีแดงเลือดนกปนน้ำตาล
 - ปากแหลมยาวตรง สีเหลือง ปลายปากดำ
 - ช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์มีลักษณะคล้ายกับนกยางกรอกพันธุ์ชวา



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรกล้าย

หากินบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำ นาข้าว พื้นที่เกษตร
ห้วย หนอง บึง กุ้งน้ำจืดและน้ำกร่อย
อาหารได้แก่ สัตว์น้ำขนาดเล็ก กุ้งกบ เขียด
แมลง ตัวอ่อนของแมลง และลูกปลานขนาดเล็ก



นกยางกรอกพันธุ์จีน
(บางตัว)

ที่มา: จารุจินต์ นกที่ตะกัญ และคณะ (2561)



นกยางควาย

CATTLE EGRET

Bubulcus, ibis (Linnaeus, 1758)

นกประจำถิ่นขนาดกลาง



ที่มา: จารุจินต์ นกที่เก๋ๆ และคณะ (2561)

ลักษณะ


- ทั้งสองเพศมีลักษณะและสีเหมือนกัน
- ปากยาวปานกลาง และโค้งเล็กน้อย สีเหลือง
- ผิวหนังบริเวณใบหน้ามีสีเหลืองแกมเขียว
- หัวกลม คอเรียวและยาวปานกลาง ปีกกว้าง
- เท้งและนิ้วสีออกดำหรือเหลืองเขียว ลำตัวสีเทา
- ช่วงฤดูผสมพันธุ์ ปาก ผิวหนังบริเวณหน้า ทา และนิ้วเป็นสีแดง
บนบริเวณหัว คอ และ หลัง เป็นสีส้ม



ภาพโดย บุษกรินทร์ เพชรเกลี้ยง

หากินตามทุ่งนา โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝูงควาย
คอยจับแมลงและสัตว์เล็กๆ ที่ตกใจกระโดดขึ้นมา
บริเวณที่ควายย่ำ ชอบอยู่ตามริมห้วย หนอง
คลอง บึง หรือพื้นที่ชุ่มน้ำ





ที่มา: จารุจินต์ นกตะกั่ว และคณะ (2561)

นกยางไทยใหญ่

GREAT EGRET

Egretta alba (Linnaeus, 1758)

นกประจำถิ่นและ
นกอพยพขนาดใหญ่

- ลักษณะ** • ปากยาวตรง ลำคอยาวมาก ปลายปีกมน ทาค่อนข้างยาว นัยยาว ขนปกคลุมลำตัวทั้งหมดเป็นสีขาว
- ช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ปากสีเหลือง ปลายปากสีเทาเล็กน้อย ผิวนัยบริเวณหน้ามีสีเหลืองอมเขียว แฉงและนัยมีสีดำ
 - ช่วงฤดูผสมพันธุ์ปากสีดำ ผิวนัยบริเวณหน้ามีสีน้ำเงินหรือน้ำเงินแกมเขียว แฉงอาจเป็นสีแดง

หากินตามแหล่งน้ำทั่วไป อาหารได้แก่ กุ้ง ปู โดยเดินลุยน้ำซึ่งระดับน้ำลึกมาก เมื่อพบเหยื่อจะใช้ปากจับแล้วกลืนกิน



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเกลี้ยง



นกยางโทนน้อย

INTERMEDIATE EGRET

Egretta intermedia (Wagler, 1829)

นกประจำถิ่นและ
นกอพยพขนาดกลาง



ภาพโดย นุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง

ลักษณะ

- ปากยาวตรงสีเหลือง
- ผิวนกบริเวณหน้าสีเหลืองหรือเหลืองแกมเขียว
- คอยาว ลำตัวสีเทา ปีกยาว ปลายปีกมน
- ขายาว แข็งและนิ้วสีดำ
- ช่วงฤดูผสมพันธุ์ปลายปากเป็นสีดำ บริเวณอกและหลังมีขนละเอียดแตกเป็นฝอย ขนเหล่านี้จะหลุดร่วงในฤดูผสมพันธุ์



หากินบริเวณแหล่งน้ำในทุ่งนา บึง ทะเลสาบ
อาหารส่วนใหญ่ ได้แก่ ปลา บริเวณน้ำตื้น
หากินโดยเดินลุยน้ำที่ไม่ลึกเกิน
แล้วใช้ปากจับเหยื่อและกลืนกิน

ที่มา: จารุจินต์ นกที่ตะกัญ และคณะ (2561)





ภาพโดย นุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง

นกยางเปี่ย

LITTLE EGRET

Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)

นกประจำถิ่นและ
นกอพยพขนาดกลาง

- ลักษณะ**
- ปากยาวตรง มีสีดำ บริเวณมุมปากมีขนเล็กน้อย
 - คอยาว ลำตัวสีขาว
 - ปีกยาว ปลายปีกมน
 - ทายาว แฉงสีดำ ปกคลุมด้วยเกล็ด
 - ช่วงฤดูผสมพันธุ์บริเวณท้ายทอยมีขนสีขาว 2 เส้น
- ลักษณะคล้ายผมเปียของคน

หากินอยู่ตามแหล่งน้ำ กุ้งนา กุ้งหอย บางครั้งพบเดินตามสัตว์เลื้อย
พวกวัว ควาย อาหารส่วนใหญ่ ได้แก่ ปลา และสัตว์ขนาดเล็ก



ที่มา: จารุจินต์ นทีตะภา และคณะ (2561)



นกยางไฟธรรมดา

CINNAMON BITTERN

Ixobrychus cinnamomeus
(Gmelin, 1789)

นกประจำถิ่น



ที่มา: จารุจินต์ นกที่ตะกั่ว และคณะ (2561)

ลักษณะ

- พบลำตัวน้ำตาลแดงสดใส
- คอด้านหน้าและลำตัวด้านล่างสีอ่อนกว่า
- ข้างคอมีแถบขาว ณะบินต่างจากชนิดอื่นที่ขนน้ำตาลแดงทั้งหมด
- ในเพศเมียจะมีลายจุดจากขอบบนสีน้ำตาลอ่อนบริเวณหลังและลำตัวด้านบน ลำตัวด้านล่างน้ำตาลอ่อน คอถึงอกมีขีดประสีน้ำตาลเข้ม



อาศัยและหากินตามทุ่งนาและ
แหล่งน้ำจืดที่มีพืชน้ำหนาแน่น

ที่มา: จารุจินต์ นกที่ตะกั่ว และคณะ (2561)



นกยางไฟหัวดำ

YELLOW BITTERN

Ixobrychus sinensis (Gmelin, 1789)


นกประจำถิ่นขนาดเล็ก - กลาง



ที่มา: จารุจินต์ นกที่ตะกัญ และคณะ (2561)

ลักษณะ

- ปากยาวสีเหลือง
- หน้าผากถึงท้ายทอยดำตัดกับหัวและลำตัวน้ำตาลอ่อนแกมเหลือง
- กลางคอตันหน้าถึงอกขาว
- หางสั้นมากสีดำ
- ขณะบินต่างจากชนิดอื่นที่ขนคลุมปลายปีกและขนปีกบินดำ ขนคลุมใต้ปีกขาว
- เพศเมียหน้าผากถึงท้ายทอยน้ำตาลดำ กลางคอถึงอกขาว เส้นยาวสีน้ำตาลชัดเจนกว่า



อาศัยและหากินตามทุ่งนาและ
แหล่งน้ำจืดที่มีพืชน้ำหนามแน่น

ที่มา: จารุจินต์ นกที่ตะกัญ และคณะ (2561)



นกแอ่นทุ่งใหญ่

ORIENTAL PRATINCOLE

Glareola maldivarum


นกอพยพขนาดเล็ก



ภาพโดย อารียา หมู่ตะเหล้ม

ลักษณะ

- ปากสั้นสีแดงปลายดำ หัว คอ และอกน้ำตาลอ่อนแกมเทา
- ใต้คอเหลืองอ่อนแกมน้ำตาลมีเส้นประดำมาถึงใต้ตา
- ท้องด้านล่างและกันขาว
- ขณะบินคล้ายนกนางแอ่น ใต้ปีกแดงแกมน้ำตาลเข้ม
- ขนปีกบินดำ โทท้าว หางแฉกสีดำ
- ช่วงผสมพันธุ์โคนปากแดงสด สีสดใสและเส้นดำใต้คอชัดเจนขึ้น



อาศัยและหากินตามทุ่งนา ทุ่งหญ้าสั้น ๆ
หนอง และบึง

ที่มา: จารุจินต์ นกัตะภาณุ และคณะ (2561)



นกปากห่าง

ASIAN OPENBILL

Anastomus oscitans (Boddaert, 1783)

นกประจำถิ่นขนาดใหญ่



ที่มา: จารุจินต์ นกตะกัญ และคณะ (2561)

ลักษณะ

- ปากยาวและใหญ่
- ปากสีน้ำตาลแกมเหลือง กลางปากค่อนไปด้านหน้าปลายเปิดเป็นช่องว่าง
- นวลำตัวสีเทา นโค่นปีก นปีกบิน และหางดำ
- แฉงและต้นสีชมพูคล้ำ
- ฤดูผสมพันธุ์ นวลำตัวสีทาวขึ้น แฉงและต้นสีแดง

อาศัยและหากินตามแหล่งน้ำจัดต่างๆ กุ่มนา หนอง บึง และพื้นที่ชุ่มน้ำ



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเกลี้ยง



เป็ดหงส์

KNOB-BILLED DUCK

Sarkidiornis melanotos (Pennant, 1769)

นกประจำถิ่นและนกอพยพ



ที่มา: จารุจินต์ นทีตะภาภิ และคณะ (2561)

ลักษณะ

- หัวและคอขาว มีจุดดำกระจายทั่ว
- ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลเหลืองปนน้ำเงิน
- ลำตัวด้านล่างขาว ด้านข้างสีเทา
- หนามบินปีกด้านบนและด้านล่างมีสีดำ
- บริเวณโคนปากของเพศผู้มีแผ่นหนังเป็นหงอนครึ่งวงกลมในช่วงฤดูผสมพันธุ์จะมีขนาดใหญ่ขึ้น

หากินอยู่ตามแหล่งน้ำ กุ้งนา น้ำตม หนอง บึง และลำห้วยในป่า พบหากินในพื้นที่พรุฉิมพลีแต่ยังไม่พบการสร้างรังวางไข่



ภาพโดย อารียา หนูทะเหล็ก




เป็ดแดง

LESSER WHISTLING-DUCK

Dendrocygna javanicus (Horsfield, 1821)

นกประจำถิ่นและนกอพยพ

ขนาดเล็ก-กลาง



ที่มา: จารุจินต์ นภีตะภักดิ์ และคณะ (2561)

ลักษณะ

- มีปากแบน กว้าง สีเทาดำ ยาว
- คอยาวปานกลาง ปีกยาวและปลายปีกแหลม
- หายาวปานกลาง แข็งและนิ้วสีเทาดำ
- ทั้งสองเพศมีลักษณะและสีขนเหมือนกัน คือลำตัวทั่วไปเป็นสีน้ำตาลแดง กระหม่อม ช่วงไหล่ และปีกเป็นสีน้ำตาลแดง เข้มกว่าบริเวณอื่น ขนปลายปีกสีดำ เวลาบินจะเห็นสีปีกตัดกับสีของลำตัวชัดเจน

หากินอยู่ตามแหล่งน้ำต่างๆ หนอง บึง และนาข้าว



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเกลี้ยง



เหยี่ยวแดง

BRAHMINY KITE

Haliastur Indus (Boddaert, 1783)

นกประจำถิ่นขนาดกลาง



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเกลี้ยง

ลักษณะ

- ปากแหลมคม ปลายปากเป็นปากงอ
- หัวค่อนข้างใหญ่ คอสั้น
- ปีกกว้าง ปลายปีกมน หางกว้าง ปลายหางค่อนข้างมน
- ขาและนิ้วค่อนข้างแข็งแรง ปลายนิ้วเป็นเล็บยาว และแหลมคม
- ทั้งสองเพศมีลักษณะเหมือนกัน ตัวเต็มวัยลำตัวสีน้ำตาลแดง ตัดกับสีของหัว คอ และอกที่เป็นสีขาวชัดเจน
- ส่วนที่เป็นสีขาวมีลายจุดสีน้ำตาลเกมดำกระจายทั่วไป

หากินอยู่ตามชายฝั่งและเกาะกลางทะเล แม่น้ำใหญ่
ทะเลสาบ หนองบึง และอ่างเก็บน้ำ



ที่มา: จารุจินต์ นทีตะภา และคณะ (2561)



เหยี่ยวทุ่ง

EASTERN MARCH-HARRIER

Circus spilonotus Kaup, 1847

นกอพยพ

ลักษณะ

- เพศผู้และเพศเมียแตกต่างกัน
- เพศผู้ในลำตัวขาวแถบเทา ลำตัวด้านบนเทาเข้มแถบน้ำตาลเข้ม และคอเป็นจุดหนา ลำตัวด้านล่างขาว หนามบินลำตัวด้านบนขาว โคนปีกและหลังเทาเข้มแถบน้ำตาล ปลายปีกสีเทาเข้ม หรือดำ ลำตัวล่างสีขาวมีลายจุดสีเข้มที่หัว คอ และอก
- เพศเมียมีลำตัวและหัวสีน้ำตาลแถบแดง หน้าสีจางกว่า คอ และอกมีจุดสีเข้ม หางสีน้ำตาลอ่อนด้านบนมีลายขวางจางๆ หางคู่กลางไม่มีลาย คอ อก และสีข้างมีลายตามยาว

อาศัยตามทุ่งนา ทุ่งหญ้า และพื้นที่ชุ่มน้ำ



นกอัญชันคิ้วขาว

WHITE-BROWED CRAKE

Poliolimnas cinerea

นกประจำถิ่นขนาดเล็กมาก

- ลักษณะ**
- ปากสีเหลืองโคนปากแดง โคนปากล่างและแถบตาดำ มีแถบขาวคล้ายคิ้วและแถบขาวที่มุมปากถึงข้างแก้ม
 - หัว คอ ออก และท้องสีเทาเข้ม
 - ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลเทาแกมเหลืองมีลายเกล็ดน้ำตาลดำ ท้องตอนล่างถึงกันน้ำตาลแกมเหลือง
 - แข้งและตีนเหลืองแกมเขียว

อาศัยตามพื้นที่ชุ่มน้ำต่าง ๆ
บึง และหนองน้ำ



ที่มา: จารุจินต์ นกิตะภักดิ์ และคณะ (2561)



นกกวัก

WHITE-BREASTED WATERHEN

Amaurornis phoenicurus

(Pennant, 1769)

นกประจำถิ่นและ

นกอพยพขนาดเล็ก-กลาง



ที่มา: จารุจินต์ นกที่ตะกั่ว และคณะ (2561)

ลักษณะ

- แท้ง และนิ้วสี่นิ้ว
- บริเวณหน้าผาก คอ ออก และท้องสีเทา ซึ่งติดกับส่วนของกระหม่อม
- คอด้านบน และลำตัวด้านบนซึ่งมีสีเทา-ดำ และบนคลุมโคนหางด้านบนล่างที่มีสีน้ำตาลแดง
- ปากค่อนข้างสั้นและตรง มีสีแดงตอนโคนปากเล็กน้อยส่วนที่เหลือของปาก มีสีเขียว
- ขา และ นิ้วเท้า สีเหลืองแกมเขียวอ่อนๆ



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรกล้าย

อาศัยและหากินตามแหล่งน้ำต่าง ๆ
ทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็ม




นกอีล้ำ

COMMON MOORHEN

Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)

นกประจำถิ่นและ

นกอพยพขนาดเล็ก-กลาง



ที่มา: จารุจินต์ นกที่ตะกั่ว และคณะ (2561)

ลักษณะ

- ตาสีน้ำตาลเข้ม
- ปากสีแดง ปลายปากสีเหลือง โคนปากบนเป็นกะบังและจะใหญ่ขึ้นในฤดูผสมพันธุ์
- ขนลำตัวทั้งหมดสีดำ อกสีดำแซมเทา
- บนหลังสีดำแซมน้ำตาล
- มีจุดสีขาวแซมตามยาวข้างลำตัว
- ก้นและขนคลุมใต้หางขาวมีแถบดำตรงกลาง



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเกลี้ยง

อาศัยตามแหล่งน้ำต่างๆ
เช่น บึง คลอง หนอง
ทะเลสาบ และอ่างเก็บน้ำ

นกอีโถ่ง

PURPLE SWAMPHEN

Porphyrio porphyrio (Linnaeus, 1758)

นกประจำถิ่นขนาดเล็ก-กลาง



ที่มา: จารุจินต์ นกที่ระกัญ และคณะ (2561)

- ลักษณะ**
- ปากหนาและแบนข้าง มีสีแดงและสีน้ำตาลแดง
 - กะบังหน้าสีแดงจาง และจะมีสีแดงเข้ม
 - ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ คอยาวปานกลาง ปีกสั้น ราค่อนข้างยาว แฉ่งและนิ้วปกติสีส้ม-แดง
 - สืบตามลำตัวทั่วไปเป็นสีม่วงเข้ม หรือสีน้ำเงินเหลือดำ แกมเขียว ด้านล่างลำตัวสีจะเด่นน้อยกว่า โดยจะเป็นสีดำปนเทา



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเกลี้ยง

อาศัยและหากินตามพืชน้ำที่ขึ้นในน้ำ
หรือชายน้ำของแหล่งน้ำต่าง ๆ
เช่น หนอง บึง ทะเลสาบ



นกกระเตแต้แวด

RED-WATTLED LAPWING

Vanellus indicus (Boddaert, 1783)

นกประจำถิ่นขนาดเล็ก-กลาง



ที่มา: จารุจินต์ นกที่ระกัญ และคณะ (2561)

ลักษณะ

- หน้าจอบตาและหัวตาสีแดงเข้ม
- ปากแดงเข้มปลายดำ หัวถึงอกสีดำ
- วนคลุมหูเป็นแถบสีขาวใหญ่ ด้านบนลำตัวสีน้ำตาล ด้านล่างลำตัวขาว
- แฉกและตีนเหลือง หางขาวมีแถบดำใหญ่พาดกลาง
- วนะบินปีกคล้ายนกกระเตหาด

อาศัยและหากินตามทุ่งนา ทุ่งหญ้า ริมน้ำใหญ่ และพื้นที่ชุ่มน้ำ



ที่มา: จารุจินต์ นกที่ระกัญ และคณะ (2561)



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเกลี้ยง

นกพริก

BRONZE-WINGED JACANA

Metopidius indicus (Latham, 1790)

นกประจำถิ่นและ
นกอพยพขนาดเล็ก



ภาพโดย นุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง

- ลักษณะ**
- ปากสีเหลืองสด สันปากบนเทาแกมฟ้า โคนปากบนแดง
 - คีวขาว คอและลำตัวด้านสว่างสีดําเป็นมัน
 - หลังช่วงบนดำเหลือบม่วง
 - ปีกและลำตัวด้านบนน้ำตาลแกมทองแดง
 - หลัง ตะโพก หาง และก้นสีน้ำตาลแดง เท้งและตีนสีเขียว

อาศัยตามแหล่งน้ำ บึง หนอง ทะเลสาบที่มีพืชน้ำ



ที่มา: จารุจินต์ นทีตะภาณุ และคณะ (2561)



นกตีนเทียน

BLACK-WINGED STILT

Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)

นกประจำถิ่นและ

นกอพยพขนาดเล็ก-กลาง



ที่มา: จารุจินต์ นกที่ตะกั่ว และคณะ (2561)

ลักษณะ

- ปากยาวเรียวแหลมสีดำ
- หายาวมากสีชมพูแกมแดง
- ตะโพกสีขาว ห้ว คอ ออก และท้องสีขาว
- เพศผู้หลังและปีกเป็นสีดำเข้ม
- ส่วนเพศเมียจะมีสีน้ำตาลแกมดำ

อาศัยและหากินตามแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น บึง หนองน้ำ ทะเลสาบ
อ่างเก็บน้ำ นาข้าว และพื้นที่ชุ่มน้ำ



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเกลี้ยง



นกนางนวลเกลบ ท้ายทอยดำ

BLACK-NAPED TERN

Sterna sumatrana

นกอพยพ

- ลักษณะ**
- ปากยาวและบางสีดำ
 - แดงตาและท้ายทอยดำ
 - หนบนลำตัวมีสีเทามากกว่าชนิดอื่น
 - หอบของปลายปีกดำ หางคู่บนอกยาวเป็นแฉกเล็ก
 - แฉงและตีนสีดำ วัยอ่อนสีท้ายทอยอ่อน
 - ปลายปากสีเหลืองอ่อน
 - ลำตัวด้านบนมีลายสีเทาเข้ม

อาศัยและหากินตามทะเลเปิด เกาะกลางทะเล และบางครั้งพบตามชายฝั่ง



ภาพโดย อารียา หนูตะเหลียม



ที่มา: จารุจินต์ นกัตะกัญ และคณะ (2561)



ที่มา: จารุจินต์ นกัตะกัญ และคณะ (2561)




นกเขาเปลา

สรสมดา

THICK-BILLED PIGEON

Treron curvirostra (Gmelin, 1789)

นกประจำถิ่นขนาดเล็ก



ลักษณะ

- ปากหนาสีเหลืองแกมเขียว โคนปากแดง
- วงรอบตาสีฟ้าอมเขียว
- ทาและนิ้วเท้าสีแดง
- หางด้านบนมีแถบกว้างสีดำ
- กระหม่อมสีเทาตัดกับหัวสีเขียว
- ช่วงไหล่ไปถึงบนคลุมปีกมีสีแดงเลือดหมู
- ขอบปีกมีลายสีเหลืองแซมด้วยลายสีดำ

อาศัยและหากินตามป่าดิบ ชายป่า
บางครั้งพบตามสวนผลไม้ และสวนสาธารณะ



ภาพโดย นิส สุธงสมารณ์

นกเป่าคอสีม่วง

ที่มา: จารุจินต์ นกตะกุก และคณะ (2561)

PINK-NECKED GREEN-PIGEON

Treron vernans (Gmelin, 1789)

นกประจำถิ่นขนาดเล็ก



- ลักษณะ**
- เพศผู้และเพศเมียแตกต่างกัน
 - เพศผู้หัวสีเทา คอและอกสีม่วง อกช่วงล่างส้มแกมน้ำตาล ท้องเขียวแกมเหลือง หลังเขียว ปีกมีแถบเหลือง หางสีเทา ปลายดำ กันน้ำตาลแดง
 - เพศเมียสีเขียว ทั่วทอয়สีเทาแกมเขียว กันสีน้ำตาลแกมเหลือง

อาศัยและหากินตามป่าชายเลน ป่าชายหาด สวนผลไม้
ป่าละเมาะ และสวนสาธารณะ



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเกตุชัย

นกเขาใหญ่

SPOTTED DOVE

Streptopelia chinensis
(Scopoli, 1786)

นกประจำถิ่นขนาดเล็ก



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเกลี้ยง

ลักษณะ

- ปากสีน้ำตาล
- ขาและนิ้วสีแดง
- ลำตัวด้านบนสีน้ำตาล
- ปีกจะมีสีเข้มกว่า มีทางพาดสีเทาบริเวณบนคลุมปีกแถวบนและบริเวณหัวปีก
- ขนหางคู่บนสุดกว้าง ตอนปลายสุดมีสีขาว
- บริเวณคอด้านบนมีแถบสีดำและจุดสีขาวตลอดแถบ
- อกสีน้ำตาลแดง หัวสีเทา



ที่มา: จารุจินต์ นกที่ทะกัญ และคณะ (2561)


อาศัยและหากินตามป่าโปร่ง
ทุ่งนา ไร่ สวน ป่าละเมาะ
และป่าพรุ

นกเขาชวา

ZEBRA DOVE

Geopelia striata (Linnaeus, 1766)

นกประจำถิ่นขนาดเล็ก



ที่มา: จารุจินต์ นกที่ตะกั่ว และคณะ (2561)

- ลักษณะ**
- รูปร่างเรียวยาว หางยาวและเรียว
 - กระหม่อมตอนหน้า คอหอย และคอด้านข้างสีเทา
 - ด้านบนลำตัวสีน้ำตาลอ่อนมีลายพาดสีดำ ไม่ค่อยเป็นระเบียบ
 - หางเป็นหางบั้ง ปลายหางและขนทางด้านนอกเป็นสีเทา
 - ปากสีเทาแกมน้ำเงิน
 - ขาและนิ้วสีแดงเข้ม

อาศัยและหากินตามป่าโปร่ง ป่าละเมาะ ในเมือง หรือในหมู่บ้าน สวนผลไม้ กุ่มนา และทุ่งหญ้า



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรกล้าย



นกเขาไฟ

RED COLLARED DOVE

Streptopelia tranquebarica

นกประจำถิ่นขนาดกลาง



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเกสียง

- ลักษณะ**
- หัวสีเทา กายทอยล่างมีแถบดำคาด
 - ลำตัวสีน้ำตาลแดงแกมม่วง
 - หลังและปีกสีเข้มกว่าท้อง
 - วนปีกบินสีเทาดำ
 - ตะโพกเทา ใต้หางขาว



ที่มา: จารุจินต์ นกที่รัก และคณะ (2561)

อาศัยและหากินตามพื้นที่เกษตรกรรม
สวน แหล่งชุมชน ชายป่า
และพื้นที่เปิดโล่งต่างๆ
อาหารได้แก่ เมล็ดพืช ใบไม้ สุนัขไผ่
และธัญพืช



นกกาเหว่า

COMMON KOEL

Eudynamys scolopacea
(Linnaeus, 1758)


นกประจำถิ่นกลาง



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเกสรชัย

- ลักษณะ**
- ปากออกสีเขียวและหนา หางยาว
 - เพศผู้ขนลำตัวสีดำเหลือบเขียว ตาสีแดงเข้ม
 - เพศเมียขนลำตัวน้ำตาลถึงน้ำตาลดำมีลายจุดและลายขวางสีขาวและน้ำตาลอ่อน

อาศัยและหากินตามป่าโปร่ง และสวนผลไม้
อาหารได้แก่ แมลงต่าง ๆ งามางชนิด กิ้งก่า จิ้งเหลน กบ เขียด
นกเล็ก ๆ และผลไม้บางชนิด



ที่มา: จารุจินต์ นกัตะนันท์ และคณะ (2561)




นกกะปูดใหญ่

GREATER COUCAL

Centropus sinensis (Stephens, 1815)

นกประจำถิ่นขนาดกลาง



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเกษียณ

ลักษณะ

- ปากหนาโค้งเล็กน้อย
- หัว คอ ลำตัวด้านล่าง และหางเหลืองดำม่วง
- หลังและปีกสีน้ำตาลแดง
- etail สีแดง ปากและนิ้วสีดำ

อาศัยและหากินตามชายป่า ป่าภูเขา
อาศัยตามพุ่มไม้รกๆ ใกล้น้ำ กินไม้เถา
อาหารได้แก่ กบ เขียด กิ้งก่า จิ้งเหลน
งู ตั๊กแตน ไช้ และแมลงต่างๆ



ที่มา: จารุจินต์ นทีตะภาณุ และคณะ (2561)

นกบั้งรอกใหญ่

GREEN-BILLED MALKOHA

Rhopodytes tristis

นกประจำถิ่นขนาดกลาง



ที่มา: จารุจินต์ นกิตะภักดิ์
และคณะ (2561)

- ลักษณะ**
- ปากมีสีเขียวขุ่น
 - หนังรอบตาสีแดงมีขนขาวรอบๆ
 - หัวสีเทาอ่อน
 - หลังและปีกมีสีน้ำตาลเหลืองเขียว
 - ลำตัวด้านล่างสีเทามีจุดสีดำเล็กๆ
 - หางยาวมาก ปลายหางขาว

อาศัยและหากินตามสวนผลไม้ ป่าดิบ ป่าผลัดใบ และชายป่า



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเกลี้ยง



นกไพร่ดก

รรรมดา

LINEATED BARBET

Psilopogon lineatus (Vieillot, 1816)

นกประจำถิ่นขนาดเล็ก



ที่มา: จารุจินต์ นกที่ชะงัด และคณะ (2561)

ลักษณะ

- หัว ออก และท้องมีสีน้ำตาลแกมเหลือง
- หน้รงอบดววงตาสีเหลือง มีจีดสีน้ำตาลเข้ม
- ปากสีเหลืองส้ม
- วนบนลำตัวสีเขียว

อาศัยและหากินตามป่าโปร่ง ป่าเต็งรัง และสวนผลไม้
อาหารได้แก่แมลง หนอน สัตว์เลื้อยคลาน และผลไม้ต่าง ๆ
โดยเฉพาะไทร หว้า ตะขบ ส้านใบเล็ก และผลไม้เถาบางชนิด
น้ำหวานของดอกไม้บางชนิด



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเกลี้ยง



นกกระเต็นอกขาว

WHITE-THROATED KINGFISHER

Halcyon smyrnensis (Linnaeus, 1758)


นกประจำถิ่นขนาดเล็ก



ที่มา: จารุจินต์ นภะตะกัง
และคณะ (2561)

- ลักษณะ**
- ลำตัวป้อม หัวใหญ่ คอและหางสั้น
 - ปากยาวสีแดงสด
 - หัว หลังตอนบน ไหล่และท้องสีน้ำตาลเข้ม
 - คอและอกขาว ปีก หลัง และหางสีฟ้าเข้ม
 - หลังตอนล่างและตะโพกสีฟ้าขาว
 - ข้างและตีน สีแดง หนามมีแถบขาวใหญ่ที่ปีก

อาศัยและหากินตามแหล่งน้ำทั่วไป กินสัตว์น้ำต่างๆ และ
อาจจะกินแมลงและสัตว์ขนาดเล็กต่างๆ ด้วย



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเกลี้ยง



นกตะขาบทู่

INDIAN ROLLER

Coracias benghalensis
(Linnaeus, 1758)

นกประจำถิ่นขนาดเล็ก-กลาง



ภาพโดย นุชรินทร์ เพชรเกลี้ยง

ลักษณะ

- หัวโต สีตัวดูดำทึบๆ ปากดำ
- ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลแกมเขียวคล้ำ
- ลำตัวด้านล่างสีม่วงแกมน้ำตาลมีลายขีดเล็กๆสีฟ้าที่คอและอกตอนบน ใต้ท้องและใต้หางมีสีฟ้าจางๆ
- ขณะบินปีกและหางสีฟ้าสดสลับน้ำเงิน



อาศัยและหากินตามทุ่งโล่งและป่า
ละม้าย มักพบเกาะอยู่เดี่ยวๆ
ตามสายไฟฟ้า ตอไม้ และกิ่งไม้ต่างๆ
คอยโฉบกินแมลง เช่น
ตั๊กแตน จิ้งหรีด

ที่มา: จารุจินต์ นกตะขาบ และคณะ (2561)



นกแอ่นตาล

ASIAN PALM-SWIFT

Cypsiurus balasiensis (Gray, 1829)

นกประจำถิ่นขนาดเล็กมาก

- ลักษณะ**
- ลำตัวสีน้ำตาลเข้ม
 - พอมบาง
 - ปีกแหลมเรียวแคบ
 - ลำตัวด้านล่างสีจางกว่า
 - หางแหลม เมื่อกางออกจะเป็นแฉกลึก

อาศัยและหากินตามทุ่งโล่ง ทุ่งหญ้า
ทุ่งนา ป่าละเมาะ และป่าโปร่ง
อาหารได้แก่แมลงต่างๆ



ที่มา: จารุจินต์ นกิตะภักดิ์ และคณะ (2561)

นกแอ่นกินรัง

EDIBLE-NEST SWIFFLET

Aerodramus fuciphagus (Thunberg, 1812)

นกประจำถิ่นขนาดเล็ก

ลักษณะ

- ลำตัวด้านบนสีดำ
- ลำตัวด้านล่างสีน้ำตาลแกมเทา
- แถบตะโพกแกมเทา
- คอและอกตอนบนสีจางกว่าท้องและกาง
- หางเว้า



ทำรังตามโพรงถ้ำบนเกาะกลางทะเล
บ้านหรืออาคารใกล้ชายฝั่งทะเล
หากินเนื้อชายป่า

ที่มา: จารุจินต์ มณีตะกัญ และคณะ (2561)



นกนางแอ่นบ้าน

BARN SWALLOW

Hirundo rustica (Linnaeus, 1758)


นกประจำถิ่นและ
นกอพยพขนาดเล็ก



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเกลี้ยง

- ลักษณะ**
- หน้าผากและคอก้นตาลแดงเข้มมีแถบดำหรือบน้ำเงินพาดอก
 - ขนลำตัวด้านบนหรือบน้ำเงินเป็นมัน
 - ลำตัวด้านล่างและขนคลุมใต้ปีกขาว
 - หางแฉกลึก ขนหางคู่บนยาวที่สุด
 - ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ขนหางจะยาวขึ้น
 - ขนหางแต่ละเส้นแยกแฉกในที่สุดมีจุดสีขาว

อาศัยและหากินตามพื้นที่เปิดโล่ง



ที่มา: จารุจินต์ นภีตะภักดิ์ และคณะ (2561)



นกนางแอ่น

แปซิฟิก

PACIFIC SWALLOW

Hirundo tahitica


นกประจำถิ่นขนาดเล็ก



ที่มา: จารุจินต์ นกิตะกัญ และคณะ (2561)

- ลักษณะ**
- สีนํ้าตาลแดงที่หน้าผากและออกกว้างกว่านกนางแอ่นบ้าน ไม่มีแถบดำคาดอก
 - บริเวณท้องสีเทาอ่อนแกมขาวมีลายจางๆ
 - กันสีนํ้าตาลเข้มลายขาว ใกล้เคียงหางมีจุดขาว
 - หางแฉก ขนคลุมใต้ปีกสีนํ้าตาลเข้ม ขนหางคู่บนออกสั้นกว่านกนางแอ่นบ้าน

อาศัยและหากินตามชายฝั่ง และเกาะกลางทะเล



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเกสียง



นกเต้านิน

COMMON SANDPIPER

Actitis hypoleucos

นกประจำถิ่นขนาดกลาง



ลักษณะ

- คล้ายนกชายเลนเขียวแต่คิ้วยาวสีขาวชัดเจน
- ทางออกทั้งสองข้างเป็นแถบสีน้ำตาล
- ด้านล่างลำตัวขาว ไหล่มีสีขาวเข้าเข้ามา
- ขณะยืนมักกระดกกันและหางขึ้นลง ขาและแก้มมีสีเหลือง
- ขณะบินมีแถบขาวชัดเจน
- ตะโพกและหางสีน้ำตาลมีลายขาวที่ขอบและปลายหาง

อาศัยและหากินตามแหล่งน้ำจืด นาเกลือ ทุ่งนา นาทุ่งใกล้ชายฝั่ง



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเกลี้ยง

นกเด้าดินทุ่งใหญ่

RICHARD'S PIPIT

Anthus novaeseelandiae (Gmelin, 1789)

นกประจำถิ่นและ

นกอพยพขนาดกลาง



ที่มา: จารุจินต์ นกตะกั่ว
และคณะ (2561)



ได้มาจากเด้าดินทุ่งใหญ่
และนกเด้าดินทุ่งเล็ก

- ลักษณะ**
- มีขนาดใหญ่กว่านกเด้าดินชนิดอื่น
 - คีวส์น้ำตาอ่อนต้อกับแถบข้างคอ
 - ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลแกมเหลืองมีลายขีด
สีคล้ำบนหัวและหลัง ลำตัวด้านล่างน้ำตาลอ่อน
 - ปากยาวกว่านกเด้าดินทุ่งพันธุ์รัสเซีย
 - แฉงและหางยาวกว่าเล็กน้อย สายบนลำตัวจาง
 - ลักษณะปลายสีด่างองุ่นคลุมปีกชั้นกลางแหลมกว่า
 - เล็บนิ้วตีนหลังยาวโค้ง คล้ายนกเด้าดินทุ่งเล็ก

อาศัยตามทุ่งหญ้า พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่เปิดโล่งต่างๆ



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเกลี้ยง



นกขมิ้นน้อย

สรสมดา

COMMON IORA

Aegithina tiphia (Linnaeus, 1758)

นกประจำถิ่นขนาดเล็ก



ที่มา: จารุจินต์ นกที่ตะกัญ และคณะ (2561)

- ลักษณะ**
- ปีกสั้น ปลายปีกมน ปีกและหางสีดำเข้ม บนปีกมีแถบสีขาวพาดขวางสองแถบ
 - หางยาวปานกลาง
 - ปากมีลักษณะเล็กแหลม
 - ขาสั้น นิ้วเท้าเล็ก แต่แข็งแรง
 - ลำตัวส่วนบนสีเหลืองปนเทาเขียว
 - ส่วนล่างของลำตัวสีเหลืองสด



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเกลี้ยง

อาศัย และหากินอยู่บนต้นไม้เท่านั้น
อาหารได้แก่ แมลง ตัวอ่อนและไข่ของ
แมลง หนอนผีเสื้อบางชนิด หนอนกินใบ



นกขมิ้น ท้ายทอยดำ

BLACK-NAPED ORIOLE

Oriolus chinensis

นกประจำถิ่นขนาดเล็ก



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเกษม

- ลักษณะ**
- เพศผู้ลำตัวสีเหลืองสด ปากสีชมพูแกมส้ม แถบคาดตาสีดำกว้างและเชื่อมกับท้ายทอย ตาสีแดง ปีกและหางสีดำและเหลือง
 - เพศเมียปีกและหลังสีเหลืองแกมเขียว



ที่มา: จารุจินต์ นทีตะภาณุ และคณะ (2561)

อาศัยและหากินตามป่าโปร่ง ป่าชายเลน
สวนสาธารณะ และชายป่า
อาหารได้แก่แมลง ผลไม้สุก และ
น้ำหวานดอกไม้

นกปรอดหน้าขาว

YELLOW-VENTED BULBUL

Pycnonotus goiavier (Scopoli, 1786)

นกประจำถิ่นขนาดเล็ก



ที่มา: จารุจินต์ นกิตะภาณุ
และคณะ (2561)

ลักษณะ

- ลำตัวด้านบนสีน้ำตาล
- กระหม่อมและหัวตาสีดำ มีคิ้วกว้างสีขาว
- กระหม่อมมีหงอนสั้นๆสีน้ำตาล
- ลำตัวด้านล่างมีสีขาว
- อกมีสีน้ำตาลแซม
- วนคลุมโคนหางด้านล่างมีสีเหลืองแกมเขียว หางไม่มีสีขาว

อาศัยและหากินตามแหล่งกสิกรรม ป่าละเมาะ โดยเฉพาะบริเวณใกล้แหล่งน้ำจัด
และชายทะเล อาหารได้แก่ แมลง ตัวหนอน และผลไม้สุกบางชนิด



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเกลี้ยง



นกปรอดสวน

STREAK-EARED BULBUL

Pycnonotus blanfordi Jerdon, 1862

นกประจำถิ่นขนาดเล็ก

ที่มา: จารุจินต์ นกที่ตะกวด และคณะ (2561)



ลักษณะ

- ตาสีเทา
- วนคลุมหูมีลายขีดสีขาวแกมเทา
- วนลำตัวสีน้ำตาล
- ก้นน้ำตาลอ่อนแกมเหลือง

อาศัยและหากินตามสวนผลไม้ ป่าโปร่ง สวนสาธารณะ และใกล้ชุมชน
อาหารได้แก่ ผลไม้ต่างๆ เช่น ไทร กล้วย ชมพู มะละกอ มะม่วง ผลตำลึงสุก
แมลง และหนอน



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเกลี้ยง



อีกา

LARGE-BILLED CROW

Corvus macrorhynchos Wagler, 1827

นกประจำถิ่นขนาดกลาง

ลักษณะ

- ปากดำมีขนาดใหญ่
- หน้าผากตั้งเป็นสัน
- ปีกยาวกว้างใหญ่
- ขาและเท้าแข็งแรง
- มีสีดำสนิททั้งตัว
- หางยาวกว้างปลายมน

อาศัยและหากินตามตามที่โล่ง ใกล้เคียงชุมชน
เป็นนกที่ชอบส่งเสียงดัง ทั้งยังจดจำ
และเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ ได้ดีอีกด้วย
อาหารได้แก่ เนื้อสัตว์ขนาดเล็ก แมลงและสัตว์ตาย



ที่มา: จารุจินต์ นกที่ระกัญ และคณะ (2561)



นกจับแมลงสีน้ำตาล


ASIAN BROWN FLYCATCHER

Muscicapa dauurica

นกอพยพขนาดเล็กมาก

- ลักษณะ**
- ลำตัวด้านบนสีเทาจนถึงน้ำตาลแกมเทา
 - ปากสีอ่อน ปลายปากสีคล้ำ ตอนโคนปากสีเหลือง
 - มีแถบสีขาวคล้ายหนวด
 - ลำตัวด้านล่างสีออกขาว
 - ข้างอกจะมีสีน้ำตาลแกมเทา
 - นิ้วเท้าสีออกดำ

อาศัยและหากินตามป่าโปร่ง กุ่มไร่
สวนผลไม้ และป่าชายเลน
อาหารได้แก่ แมลงต่างๆ ใช้วิธีโฉบจับ
จากกลางอากาศ



ที่มา: จารุจินต์ นกิตะภักดิ์ และคณะ (2561)



นกจาบคาหัวเขียว

BLUE-TAILED BEE-EATER

Merops philippinus (Linnaeus, 1766)

นกอพยพขนาดเล็ก

ลักษณะ

- ปากโค้งแหลมสีดำ
- หัวสีเขียวแกมน้ำตาลแดง แดงตาดำ ใต้แถบตาและคางขาวแกมเหลือง
- คอและอกตอนบนสีส้มแกมน้ำตาล
- ตะโพกฟ้าขาว หางสีฟ้า
- หางคู่กลางยาว

อาศัยและหากินตามพื้นที่ป่าโล่งใกล้น้ำ อาหารได้แก่แมลงต่างๆ โดยเฉพาะผึ้ง



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเกลี้ยง



ที่มา: จารุจินต์ นกตะกัญ และคณะ (2561)

นกกระจอยป่าโกงกาง

FLYEATER

Gerygone sulphurea Wallace, 1864

นกประจำถิ่นขนาดเล็กมาก

- ลักษณะ**
- คล้ายนกกระจัด แต่ปากหนากว่าสีดำ หัวเทา
 - ส่วนหัวและลำตัวด้านบนขนแน่นน้ำตาล
 - คางและลำตัวด้านล่างสีเหลืองอ่อน หน้าสีคล้ำ
 - ปลายหางมีสีเทาเข้ม

อาศัยและหากินตามใกล้ชายฝั่งทะเล ป่าพรุ และป่าชายเลน
อาหารได้แก่ แมลงขนาดเล็ก



ที่มา: จารุจินต์ นกที่ตะกั่ว และคณะ (2561)



นกกระเจิบหน้าท้องเหลือง


YELLOW-BELLIED PRINA

Prinia flaviventris (Delessert, 1840)

นกประจำถิ่นขนาดเล็กมาก

ลักษณะ

- หัวสีเทา ลำตัวด้านบนสีเขียวแกมเหลือง
- ท้องถึงกันเหลืองสดเป็นจุดเด่น
- คอหอยและอกสีเทา-สีครีม
- คิ้วและวงรอบเบ้าตาสีขาว
- มีคิ้วขาวสั้นๆ



อาศัยและหากินตามป่าหญ้า ป่าละเมาะ
บริเวณชายแหล่งน้ำต่าง ๆ
หากินภายในพุ่มหญ้า กอกก หรือพุ่มไม้
กินแมลงเป็นอาหาร

ที่มา: จารุจินต์ นกัตะภักดิ์ และคณะ (2561)



นกกระเจิบหญ้าสีเขียว

PLAIN PRINIA


Prinia inornata (Sykes, 1832)

นกประจำถิ่นขนาดเล็ก

ลักษณะ

- คี้วยาวสีเทาหรือเทาแกมเหลืองชัดเจน
- หัวและลำตัวด้านบนน้ำตาล
- ลำตัวด้านล่างเทาแกมน้ำตาลเหลือง
- พบทางใหญ่กว่านกกระเจิบหญ้าอกเทาและนกกระเจิบหญ้าสีข้างแดง
- ปลายหางด้านล่างกลีบน้ำตาลเข้มและขาว

อาศัยและหากินตามทุ่งหญ้าและพื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นนกกินแมลง



ที่มา: จารุจินต์ นกที่ระลึก และคณะ (2561)

นกกระเจิบ

สรสมดา

COMMON TAILORBIRD

Orthotomus sutorius
(Pennant, 1769)



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเสี้ยว

นกประจำถิ่นขนาดเล็กมาก

ลักษณะ

- หน้าผากและกระหม่อมสีน้ำตาลแดง
- คิ้วและหน้าขาวแกมเทา
- ลำตัวด้านบนสีเขียวคล้ำ ลำตัวด้านล่างขาว
- บริเวณอกและคอหอยเป็นสีคล้ำ
- ใต้คอเห็นเป็นสีดำโดยเฉพาะตอนร้อง

อาศัยและหากินตามป่าโปร่ง ป่ารุ่น ป่าชายเลน กุ่มหญ้า ป่าละเมาะ และสวนผลไม้
อาหารได้แก่ แมลงและตัวหนอนต่างๆ



ที่มา: จารุจินต์ นกตะกั้ง และคณะ (2561)



นกกระเจิบ

หัวแดง

ASHY

TAILORBIRD



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเกลี้ยง

Orthotomus sepium Horsfield, 1821

นกประจำถิ่นขนาดเล็ก

ลักษณะ

- เพศผู้กระหม่อม หน้า แก้ม และคางสีน้ำตาลตัดกับลำตัวสีเทาเข้ม หางสีเทาแกมน้ำตาลสลายหางดำทิว แตกต่างจากนกกระเจิบอื่นๆ
- เพศเมียมีสีที่อ่อนกว่าเพศผู้เล็กน้อย กลางคอ ออก และท้องมีสีทาว นกวัยอ่อนจะไม่มีสีน้ำตาลแดงที่หน้า ด้านบนลำตัวสีน้ำตาลแกมเทา ด้านล่างลำตัวทาว พบเฉพาะภาคใต้

อาศัยและหากินตามป่าพรุ และป่าชายเลน



ที่มา: จารุจินต์ นกตะกั่ว และคณะ (2561)



นกกางเขนบ้าน

ORIENTAL MAGPIE-ROBIN

Copsychus saularis (Linnaeus, 1758)


นกประจำถิ่นขนาดเล็ก



ภาพโดย นุชกรินทร์ เพชรเกลี้ยง

ลักษณะ

- ปากสีเทาเรียว ปลายปากบนงุ้มลงเล็กน้อย
- ปีกมนกลม หางยาวปานกลาง ปลายหางตัดตรง
- ขาและเท้าแข็งแรง
- ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะและสีสัณแตกต่างกัน
- ตัวผู้ในขณะเกาะลำตัวค่อนข้างตั้งตรง หางกระดก ส่วนบนลำตัวเป็นสีดำเหลือบน้ำเงินเล็กน้อย ปีกมีแถบสีขาวหนึ่งแถบ ส่วนล่างของลำตัวเป็นสีขาว
- ตัวเมีย ส่วนบนลำตัวเป็นสีเทา มีแถบบริเวณปีกเช่นเดียวกัน ส่วนล่างลำตัวเป็นสีเทาจาง



ที่มา: จารุจินต์ นกิตะภักดิ์ และคณะ (2561)

พบได้แทบทุกบริเวณ
อาหารได้แก่ แมลงต่าง ๆ
หนอน และไส้เดือน



นกอีแพรด แถบอกดำ PIED FANTAIL



Rhipidura javanica (Sparrman, 1788)

ที่มา: จารุจินต์ นกที่ระกัญ และคณะ (2561)

นกประจำถิ่นขนาดเล็ก

ลักษณะ

- ตัวคอสี ต่อจากสีขาวยมีลายพาดสีดำผ่านอกตอนบน
- ก้องมีสีขาวยแถบครีม
- หัวสีออกดำ คิ้วเป็นสีขาวเล็กน้อย
- หางกางแผ่ออกเป็นรูปพัด ปลายขนหางสีขาว

อาศัยและหากินตามสวนผลไม้ แหล่งเกษตรกรรม ป่าละเมาะ กุ่มไร่
ป่าชายเลน ป่าโกงกาง ป่าพรุ อาหาร ได้แก่แมลงขนาดเล็ก ยุง และหนอน



ภาพโดย บุษจรินทร์ เพชรเกียรติยง




นกอีเสือ สีน้ำตาล

BROWN SHRIKE

Lanius cristatus Linnaeus, 1758

นกอพยพขนาดเล็ก



ลักษณะ

- ปากหนาใหญ่ สีดำ ปลายปากแหลมจับ
- หัวโต ลำตัวเพรียว หางยาว มีแถบสีดำจากโคนปากผ่านตาไปถึงข้างหู
- มีคิ้วสีขาวลากจากโคนปากไปถึงข้างหูด้วยเช่นกัน
- กระหม่อมและท้ายทอยสีน้ำตาลอมแดง
- ปีกสีน้ำตาลเข้ม ลำตัวด้านล่างสีขาว
- ขาสีดำ มีนิ้วเท้าแข็งแรง และเล็บแหลมคม



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเกลี้ยง

อาศัยและหากินตามที่โล่งใกล้แหล่งน้ำหรือบริเวณที่ค่อนข้างแห้งแล้งหาอาหารในช่วงเช้าตรู่และเย็นค้ำอาหารได้แก่ แมลง ตัวหนอน กบ กิ้งก่า นก หนู และสัตว์ขนาดเล็ก

นกเอี้ยงสาริกา

COMMON MYNA

Acridotheres tristis (Linnaeus, 1766)

นกประจำถิ่นขนาดเล็ก



ที่มา: จารุจินต์ มกัฒะภักดิ์ และคณะ (2561)

ลักษณะ

- หัวและคอสีดำ
- ปากและหนังรอบดวงตาสีเหลือง
- ลำตัวสีน้ำตาลเทาเข้ม กลางท้องและก้นขาว
- ขนปีกดำมีแถบขาว ขนบนใต้ปีกขาว
- ปีกบนมีแถบขาวเป็นวงใหญ่
- แก้วและตีนเหลือง

อาศัยอยู่ในป่าดิบทั่วๆไป อาหารส่วนใหญ่ได้แก่แมลง ตัวหนอน สัตว์ขนาดเล็ก รัญพืช สัตว์เลื้อยคลานตัวเล็กๆ



ภาพโดย บุษจรินทร์ เพชรเกลี้ยง



นกเอี้ยงควาย

JUNGLE MYNA

Acridotheres fuscus (Wagler, 1827)

นกประจำถิ่นขนาดเล็ก



ที่มา: จารุจินต์ นกที่ตะกั่ว และคณะ (2561)

ลักษณะ

- ปากมีสีส้มเหลือง โคนปากสีฟ้าแกมเทา
- หัวและคอมีสีดำ
- บริเวณหน้าผากมีหงอนสั้นกว่านกเอี้ยงหงอน
- ตาเหลือง ไม่มีหนังรอบดวงตา
- ลำตัวมีสีเทาหรือเทาแกมน้ำตาล
- บริเวณอกสีเทาเข้มแกมดำ แฉ่งและตีนมีสีเหลือง

อาศัยและหากินตามพื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่โล่ง
อาหารได้แก่ แมลง ผลไม้ เมล็ดพืช และสัตว์ขนาดเล็กอื่นๆ



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเกลี้ยง



นกกินปลีคอ สีน้ำตาล

BROWN-THROATED SUNBIRD




ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรกล้าย

Anthrepte smalacensis (Scopoli, 1786)

นกประจำถิ่นขนาดเล็กมาก

ลักษณะ

- เพศผู้มีกระหม่อม ก้ายทอย หลังตอนบน ลงมาถึงด้านข้างของคอเล็กน้อย เป็นสีเขียวเข้มเหลือบมัน ลำตัวด้านบน ขนปีกสีน้ำตาลมีแถบเล็กๆสีม่วงเหลือบมันที่ขนหัวปีกใกล้บริเวณไหล่ บริเวณหลังตาลงมาถึงบนคลุมหู สีแดงเลือดหมู ใต้คอสีแดงแกมส้มอมแดง ทาสีแดง ปากสีดำ จมูกและนิ้วเท้าสีเขียวเข้ม
- เพศเมียมีบนคลุมด้านหลังสีน้ำตาลอมเขียว ท้องสีเหลือง มีวงทาสีเหลืองอ่อน



ที่มา: จารุจินต์ นกตะกัญ และคณะ (2561)

อาศัยและหากินตามป่าดงดิบ ป่าพรุน้ำจืด
อาหารส่วนใหญ่ได้แก่ แมลง แมงมุม เกสร
ดอกไม้ น้ำหวานจากดอกไม้บางชนิด และ
ผลไม้สุกขนาดเล็กบางชนิด



นกกินปลี อกเหลือง OLIVE-BACKED SUNBIRD

Nectarinia jugularis (Linnaeus, 1766)


นกประจำถิ่นนกขนาดเล็กมาก



ภาพโดย นุชจรีนาร์ เพชรเกลี้ยง

- ลักษณะ**
- คอและอกส่วนบนสีน้ำเงินเหลืองเป็นมัน
 - ก้องและบนคลุมโคนหางด้านล่างสีเหลืองสด
 - ปลายหางด้านล่างมีโคนบนและแถบบนคู่กลางสีดำ
 - ขอบหางและลิ้นปลายหางสีเทา
 - ลำตัวด้านบนสีเขียวอมน้ำตาล
 - ใต้คอจนถึงอกส่วนบนสีเหลืองน้ำเงินเข้ม
 - อกและก้องส่วนล่างสีเหลืองสด
 - บนคลุมโคนหางสีเหลือง

อาศัยและหากินตามป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าชายเลน ป่าละมะ ป่าโปร่ง
ชายฝั่งทะเล ส่วนผลไม้ ส่วนไม้ดอก และกุ่มไลง



ที่มา: จารุจินต์ นกัตะภักดิ์ และคณะ (2561)

นกสีชมพูสวน

SCARLET-BACKED FLOWERPECKER

Dicaeum cruentatum (Linnaeus, 1758)

นกประจำถิ่นขนาดเล็กมาก




ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเกลี้ยง

ลักษณะ

- มีรูปร่างป้อม คอสั้น หางสั้นมาก
- ปากสั้น จี๋งหัว ออกตอนบน
- หลัง และหางมีสีดำ
- หน้าผากถึงตะโพกเป็นแถบยาวสีแดงสด
- คอ กลางอก และลำตัวด้านล่างมีสีเทา
- สีข้างลำตัวมีสีเทาแกมเทา

อาศัยและหากินตามพื้นที่ราบต่ำ ป่าละเมาะ พื้นที่เกษตรกรรม
อาหารได้แก่ แมลง แมงมุม ลูกไม้สุกงขนาดเล็ก
เช่น ลูกตะขบ มะเดื่อ น้ำหวานจากดอกไม้บางชนิด



ที่มา: จารุจินต์ นกที่ระกัญ และคณะ (2561)




นกกระจาบ

สรสมดา

BAYA WEAVER

Ploceus philippinus (Linnaeus, 1766)

นกประจำถิ่นขนาดเล็กมาก



ภาพโดย บุชรินทร์ เพชรเกลี้ยง

ลักษณะ

- ปากมีสีเนื้อ ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนแกมเหลือง
- บริเวณข้างแก้มเรียบ หัวมีลายสีคล้ำ
- ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลเข้มมีลายจากขอบบนสีจาง ชูตงช่วงผสมพันธุ์ของเพศผู้
- ปากสีดำค่อนข้างยาว
- บริเวณหน้าผากถึงท้ายทอยเหลืองสด

- หน้าสีคล้ำ ปีก หลัง และลำตัวด้านบนสีน้ำตาลดำและมีลายจากขอบบนสีน้ำตาลอ่อน
- ด้านล่างลำตัวสีน้ำตาลอ่อนแกมเหลือง



อาศัยและหากินตามทุ่งหญ้า
ทุ่งนา และพื้นที่ชุ่มน้ำ


ที่มา: จารุจินต์ นกัตะภักดิ์ และคณะ (2561)

นกกระตีดสีอิฐ

CHESTNUT MUNIA

Lonchura atricapilla

นกประจำถิ่นขนาดเล็กมาก



ที่มา: จารุจินต์ พัทธะภักดิ์ และคณะ (2561)

ลักษณะ

- หัวและอกสีดำตัดกับขนลำตัวสีน้ำตาลแดง
- ปากสีเทาแกมฟ้า
- กลางท้องและกันมีสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ
- นกวัยอ่อนลำตัวมีสีน้ำตาลเรียบๆ
- ปากสีเทาแกมฟ้า

อาศัยและหากินตามทุ่งนา ทุ่งหญ้า ป่าละเมาะ และพื้นที่ชุ่มน้ำ
อาหารได้แก่ เมล็ดข้าวเปลือก เมล็ดหญ้า แมลง และตัวหนอน



ภาพโดย บุษจรินทร์ เพชรเกลี้ยง

หมายเหตุ

คำบรรยายลักษณะอ้างอิงจากลักษณะที่พบจากการสำรวจและเพิ่มเติมข้อมูลจาก จารุจินต์ และคณะ (2561); ปัทมาภรณ์ และศักดิ์อนันต์ (2552)

เอกสารอ้างอิง

จารุจินต์ นกัตะภักุ, กานต์ เลงะกุล และวัชระ สงวนสมบัฒ. 2561. **คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลงะกุล นกเมืองไทย**. คณะบุคคณายแพทยบุญส่ง เลงะกุล. กรุงเทพว.

ปัทมาภรณ์ หมายดบุญ และ ศักดิ์อนันต์ ปลากอง (บรรณารัการ). 2552. **สัตว์มีกระดูกสันหลังในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา**. ในหนังสือชุด โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลสารสนเทศ และแผนที่ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรทางทะเล ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา. ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สงขลา.



บันทึก



